

6.4.2 Inhaalvaccinatieschema voor ontheemden uit Oekraïne

| Leeftijd (indien geen vaccins gehad of geen vaccinatiebewijs) | (prik)moment 1 | 1 maand na moment 1 | 2 maand na moment 1 | 3 maand na moment 1 | 8 of 9 maand na moment 1 |
|---|---|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| >5 maanden* en <12 maanden | Hexyon Prevenar 13 | / | Hexyon Prevenar 13 | MMRVaxPro** NeisVac C** | Hexyon Prevenar 13 |
| Van 1 tot <2 jaar | Hexyon MMRVaxPro | Prevenar 13 NeisVac C | Hexyon | / | Hexyon |
| van 2 tot 12 jaar | Hexyon MMRVaxPro | NeisVac C | Hexyon MMRVaxPro | / | Hexyon |
| Van 12 jaar tot 18 jaar | Imovax Polio MMRVaxPro Triaxis*** | MMRVaxPro NeisVac-C | Imovax Polio Triaxis | | Triaxis Imovax Polio |
| > 18 jaar (niet zwanger) | Imovax Polio MMRVaxPro Triaxis*** | MMRVaxPro | Triaxis | | |
| zwanger**** | Triaxis Imovax Polio | / | Triaxis **** | / | Triaxis **** |

* baby's < 5 maand: het basisvaccinatieschema volgen (vanaf 8 weken)

** enkel als de leeftijd van 1 jaar al bereikt is, anders later dan '3 maand na prikmoment 1' inplannen

*** indien 3 prikken te veel is in één tijd, dan kan Triaxis® ook gegeven worden tijdens het tweede prikmoment

**** zodra bevallen : MMRVAXPRO®

COVID vaccinatie nodig?

09/210 10 44

1. Er is bewijs van COVID vaccinatie in Oekraïne?
 - a. Registreer in vaccinet
 - b. Bepaal of een booster noodzakelijk / wenselijk is
 - c. Bel de vaccinatielijn voor een afspraak: 09 210 10 44
2. Er is géén bewijs van COVID vaccinatie in Oekraïne
 - a. Verwijs naar vaccinatielijn voor primovaccinatie